

FICHA TÉCNICA



Coverttrue

COADYUVANTE SILICONADO

Humectante • Penetrante • Dispersante

**SILICONADO AGRÍCOLA PARA SE USADO EN
COMBINACIÓN CON PRODUCTOS FITOSANITARIOS**

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Polimetril Xilosano (Oxirane)..... 100.00 %

CARACTERISTICAS

FEEDFOL COVERTTRUE es un surfactante de alta tecnología, reduce extremadamente la tensión superficial de las gotas (entre- 25 a 50 veces), mejora la penetración de los plaguicidas a través del flujo estomatal aumentando su absorción, provee mayor resistencia a la lluvia y permite la reducción de los volúmenes de pulverización optimizando la eficacia.

PRECAUCIONES

Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados. El producto debe ser transportado, protegido con un embalaje adecuado y no conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal. Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado. Durante la mezcla hacer uso de guantes protectores y botas. Debido a que el producto puede irritarle la vista hacer uso de anteojos protectores. No coma, beba, ni fume durante la aplicación o manipuleo. En caso de haber estado en contacto con el producto así como después de cada aplicación, se recomienda lavarse bien así como cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acoplo autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



RECOMENDACIONES DE USO

Una vez preparado el plaguicida en una cantidad reducida de agua, añadir la cantidad correspondiente de COVERTTRUE de acuerdo al grupo a que pertenezca el plaguicida.

No mezclar con productos a base de cobre.

CULTIVOS	DOSIS 200 L/AGUA	DOSIS MOCHILA DE 20 L
Papa, arroz, maíz, café y hortalizas	25 - 50 ml	2.5 - 5.0 ml
Cebolla y ajo	20 - 100 ml	5.0 - 10.0 ml
Frutales (cítricos, vid, palto, etc.)	20 - 30 ml	2.0 - 3.0 ml
En mezcla con Dormex:		
Melocotonero y manzano	50 - 100 ml	5.0 - 10.0 ml
Vid (equipo accionado con tractor)	10 - 30 ml	1.0 - 3.0 ml
Vid (mochila manual)	50 - 100 ml	5.0 - 10.0 ml
En mezcla con herbicidas	50 - 100 ml	5.0 - 10.0 ml

PRIMEROS AUXILIOS

Tras contacto con la piel; lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Tras contacto con los ojos; lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos. En caso de ingestión; lavar inmediatamente la boca, buscar ayuda médica.

PARA EL MEDICO

Tratamiento sintomático (descontaminar funciones vitales), no es conocido ningún antídoto.

DL/50 del producto formulado: Aguda Oral: 3 200 mg/kg | Aguda Dermal :1 500 mg/kg

MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- No es explosivo
- No es inflamable
- Medio de extinción adecuado : . Químicos secos, espuma, agua.

