

FICHA TÉCNICA

Potasio

COMPOSICION QUIMICA

	%p/p	%p/v
Oxido de Potasio totalmente soluble en agua	30%	39%
Agente complejante: EDTA		

CARACTERISTICAS

La fertilidad del suelo en potasio es la capacidad de suministrar dicho elemento de acuerdo a las necesidades del cultivo a lo largo de todo su ciclo.

FEEDFOL POTASIO se recomienda en todos aquellos cultivos que necesiten potasio especialmente en:

Olivo: aumento del calibre, del contenido en aceite (grasa) y de la dureza de pulpa.

Frutales: Aumento del calibre y adelanto de la maduración.

Cítricos: Aumento del calibre, peso, contenido en azúcar y disminución del espesor de la corteza. En variedades tempranas puede adelantar la maduración.

Hortícolas: mayor tamaño, peso, color y dureza

Vid: mayor tamaño, peso, color y dureza

Algodón: adelanta la maduración, aumenta el tamaño y peso de la cápsula (bola) y mejora la calidad de la fibra (especialmente en la longitud).



RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS 200 L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Vid	1 L	Aplicar desde el brote y repetir cada 20 días hasta el crecimiento del racimo.
Algodón	1 L	A los 25 días de la germinación crecimiento e inicio de botoneo.
Ajies, paprika, pimiento y tomate	1 L	A los 7 das despues del trasplante, otra en prefloracion y repetir 2 veces.
Cebolla, ajo	1 L	A los 8 das del almacigo, trasplante, crecimiento vegetativo, crecimiento de bulbo. De 2 a 4 aplicaciones.
Cucurbitceas: Zapallo, melon, sanda	1 L	Al inicio de guas, inicio de floracion y repetir cada 15 das 2 a 3 veces.
Fresas	1 L	Despues del trasplante, inicio de floracion y crecimiento de fruto. Repetir despues de la cosecha.
Frutales: Mango, lucuma, manzano, palto olivo	1 L	Realizar 2 a 4 aplicaciones por campa.
Hortalizas: Nabo zanahoria, poro, col, lechuga	1 L	A los 7 das despues del trasplante Aplicar 2 a 3 veces durante el cultivo
Leguminosas: Frijol, Habas, lentejas garbanzo, etc.	1 L	A los 15 das de germinacion prefloracion y otra durante el crecimiento de vaina.
Ctricos: Mandarina, toronja, limon, naranja	1 L	Al inicio de la floracion el cuajo de los frutos, cada 15 o 20 das
Papa, camote	1 L	A los 20 das de la germinacion, despues del primer aporte y repetir 2 veces durante tuberizacion.
Plantas ornamentales	1 L	Aplicar durante la siembra de estacas en prefloracion y botones.
Cereales; maiz arroz, cebada, avena, trigo,	1 L	Antes de floracion, otra a la floracion del espigado.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada con abundante agua y jabon.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de inhalacion: sacar a la victima del rea contaminada.
- En caso de ingeston: hacer beber a la victima abundante agua y llamar a un medico.

MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- No es explosivo
- No es inflamable
- Medio de extincion adecuado : . Quimicos secos, espuma, agua.

